

## LICEO CLASSICO STATALE GIOSUÉ CARDUCCI - MILANO

Via Beroldo, 9 – 20127 Tel. 022847232
Via Demostene, 40 – 20128 Tel. 0236554629
mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it
MIPC03000N – Cod.fiscale 80126650151
www.liceoclassicocarducci.edu.it

CIR. 50, 27/9/2023

DOCENTI – STUDENTI - GENITORI PERSONALE ATA ALBO DI ISTITUTO

Oggetto: Indicazioni per la prevenzione e la mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars Cov2.

Si comunicano di seguito le misure di prevenzione e mitigazione delle infezioni da COVID19, come da indicazioni del Ministero della Salute (<u>CM 25613 del 11/8/20923</u>).

Queste misure sono volte a garantire la sicurezza e la salute di tutti in un contesto scolastico, in cui la precauzione e la responsabilità individuale sono fondamentali per la salute e il benessere della comunità, dentro e fuori dall'Istituto.

Allo stato attuale, le persone positive a un test diagnostico molecolare o antigenico non sono più sottoposte alla misura cautelare dell'isolamento.

Sono, tuttavia, raccomandate le seguenti precauzioni:

- se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- se si è asintomatici, indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, in particolare se anziane, fragili o immunodepresse;
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa o se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni e se le condizioni cliniche peggiorano;
- applicare una corretta igiene delle mani, lavandole spesso con acqua e sapone o utilizzando un igienizzante mani efficace;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA.

Per le persone venute in contatto con casi Covid non si applica nessuna misura restrittiva, ma si raccomanda comunque di adottare precauzioni simili a quelle utilizzate per prevenire la trasmissione della maggior parte delle infezioni respiratorie e di porre attenzione all'eventuale comparsa di sintomi compatibili con i sintomi Covid-19, nei giorni immediatamente successivi al contatto.